

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

# СИСТЕЙН®

## ГЕЛЬ

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

### ОПИСАНИЕ

Систейн® Гель средство офтальмологическое – стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400 4,0 мг/мл, пропиленгликоль 3,0 мг/мл, гидроксипропилгуар 7,0 мг/мл, сорбитол 14,0 мг/мл, аминотетилпропанол 5,7 мг/мл, борную кислоту 3,0 мг/мл, калия хлорид 1,2 мг/мл, натрия хлорид 1,0 мг/мл, динатрия эдетат 0,25 мг/мл, ПОЛИКВАД® (поликватерний-1) 0,01 мг/мл, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную.

### ПОКАЗАНИЯ

Систейн® Гель средство офтальмологическое применяется для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» (от умеренной до тяжелой степени выраженности), таких как дискомфорт, жжение и раздражение.

Систейн® Гель смазывает и восстанавливает глазную поверхность, защищая ее от дальнейшего повреждения.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам Систейн® Гель средства офтальмологического.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флакон встряхивать!

Систейн® Гель средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня, а также в ночное время. Систейн® Гель средство офтальмологическое может использоваться для снятия симптомов синдрома «сухого глаза», ассоциированного с ношением контактных линз. Систейн® Гель применяется до надевания и после снятия контактных линз для увлажнения роговицы. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

### ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 3 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

### ФОРМА ВЫПУСКА

Систейн® Гель средство офтальмологическое выпускается во флаконах по 3-15 мл.

СТЕРИЛЬНО.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

"Алкон Лабораториз, Инк.", 6201 Саус Фривэй, Форт Ворс, TX 76134-2099, США/ Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

### Место производства:

Алкон Кузи С.А., Камил Фабра 58, Апартадо 2, 08320 Эль Масноу, Барселона, Испания/ Alcon Cusi S.A., Camil Fabra 58, Apartado 2, 08320 El Masnou, Barcelona, Spain

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Новартис Фарма", 125315, Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 3. Тел. +7(495)967-12-70



www.systane.ru

© 2012, 2017 Novartis

NOVARTIS

601822 RU

		Telephone +353 (0)1 440 3222 novartis@perigord-as.com www.perigord-as.com	Unit 1, Lyncon Court IDA Business & Technology Park Snugborough Rd Blanchardstown Dublin 15
Live Text: <input checked="" type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No / <input type="checkbox"/> Both	Production Site: El Masnou		
WO: 1589276	ACC: TAULER ROYO, ANNA		
Comp. Description: LFT_SYSUL_LDMO_4/3MG/ML_LDPE_10ML_(X)_RU	Printing Colours: Black		
Comp. No. New: 601822 RU	Technical Colours: Cutting		
Comp. No. Old: 601821 SU			
Format/Dimension: 125 X 250 mm			
Tech. Drawing No.: MT0103-1			
Min. Font Size Text: 9 pt			
Font Type: Helvetica			
Proof No.: 3 Date: 07 Jun 2017 J.N.: 304481			
Braille: N/A			

Approval Box and Ready for Print Box only to be used in case Artbase is not used.

Checking against manuscript according to SOP-0022667. To be signed by AwOps.

Technical approval. To be signed by Manufacturing Site.

! PLEASE TURN OVERPRINTING ON !