



Средство офтальмологическое

Инструкция по применению

СИСТЕЙН®

ГЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

Средство офтальмологическое Систейн® Гель – стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400 4,0 мг/мл, пропиленгликоль 3,0 мг/мл, гидроксипропилгуар 7,0 мг/мл, сорбитол 14,0 мг/мл, аминотетилпропанол 5,7 мг/мл, борную кислоту 3,0 мг/мл, калия хлорид 1,2 мг/мл, натрия хлорид 1,0 мг/мл, динатрия эдетат 0,25 мг/мл, ПОЛИКВАД™ (поликватерний-1) 0,01 мг/мл, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную.

ПОКАЗАНИЯ

Средство офтальмологическое Систейн® Гель применяется для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» (от умеренной до тяжелой степени выраженности), таких как дискомфорт, жжение и раздражение. Средство офтальмологическое Систейн® Гель смазывает и восстанавливает глазную поверхность, защищая ее от дальнейшего повреждения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам Средства офтальмологического Систейн® Гель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флакон встряхивать!

Средство офтальмологическое Систейн® Гель может применяться по мере необходимости на протяжении дня, а также в ночное время. Средство офтальмологическое Систейн® Гель может использоваться для снятия симптомов синдрома «сухого глаза», ассоциированного с ношением контактных линз. Средство офтальмологическое Систейн® Гель применяется до надевания и после снятия контактных линз для увлажнения роговицы. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 3 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

ФОРМА ВЫПУСКА

Средство офтальмологическое Систейн® Гель выпускается во флаконах по 3-15 мл. СТЕРИЛЬНО.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


"Алкон Лабораториз, Инк.", США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО "Алкон Фармацевтика", 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 3. Тел. +7(495)961-13-33

ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РБ:

ООО «Алкон МедТех», ул. Нарочанская, 11-2, этаж 1, офис 21, 220020, Минск, Республика Беларусь



www.systane.ru
© 2021 Alcon Inc.

Alcon

300047047-0221